

2021-05-24

## **VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: trombozės su trombocitopenija rizika (atnaujinta)**

Gerbiamas Sveikatos priežiūros specialiste,

AstraZeneca AB, suderinusi su Europos vaistų agentūra ir Valstybine vaistų kontrolės tarnyba, norėtų pateikti Jums šią informaciją.

### **Santrauka**

- **Vaxzevria negalima skiepytis žmonėms, kuriems po ankstesnio skiepo Vaxzevria pasireiškė trombozės su trombocitopenija sindromas (TTS).**
- **Pasireiškus TTS, reikia specializuotų klinikinių priemonių. Kad tinkamai diagnozuotų ir gydytų šią būklę, sveikatos priežiūros specialistai turi susipažinti su reikiamomis metodikomis ir (arba) pasikonsultuoti su atitinkamos srities specialistais (pvz., hematologu ar krešėjimo ekspertu).**
- **Nustačius trombocitopeniją per 3 savaites po Vaxzevria skiepo, reikia ištirti, ar nėra trombozės požymių. Panašiai reikia ištirti dėl galimos trombocitopenijos pacientus, kuriems per 3 savaites po skiepo nustatoma trombozė.**

Vaxzevria preparato charakteristikų santrauka (PCS) papildyta šia informacija.

### **Susirūpinimo saugumo prielaidos**

Vaxzevria yra skirta 18 metų ir vyresnių žmonių aktyviai imunizacijai siekiant išvengti COVID-19 ligos, kurią sukelia SARS-CoV-2.

Labai retais atvejais Vaxzevria paskiepytiems žmonėms pasireiškė trombozė su trombocitopenija ir (kai kuriais atvejais) kartu prasidėjo kraujavimas. Tarp užfiksuotų atvejų buvo sunkių – tai venų trombozė, įskaitant neįprastas vietas (smegenų venų sinusų trombozę, vidaus organų venų trombozę) bei arterijų trombozė su trombocitopenija. Kai kurie atvejai baigėsi mirtimi. Dauguma jų užfiksuoti per pirmąsias 3 savaites po skiepo moterims iki 60 metų amžiaus.

Sveikatos priežiūros specialistai turi būti budrūs dėl tromboembolijos ir (arba) trombocitopenijos požymių ir simptomų. Paskiepytiems žmonėms reikia nurodyti nedelsiant kreiptis į gydytoją, jei pasireikštų dusulys, krūtinės skausmas, kojos patinimas, kojos skausmas arba nuolatinis pilvo skausmas. Be to, būtina nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju, jeigu per kelias dienas po skiepo pasireikštų neurologinių simptomų, t.y. stiprus ar nuolatinis galvos skausmas, neryškus matymas, orientacijos sutrikimų ar traukulių arba susidarytų taškinių kraujosruvų odoje už skiepo vietos.

Nustačius trombocitopeniją per 3 savaites po skiepo reikia ištirti, ar nėra trombozės požymių. Panašiai reikia ištirti dėl galimos trombocitopenijos pacientus, kuriems per 3 savaites po skiepo nustatoma trombozė.

UAB „AstraZeneca Lietuva“  
Spaudos g. 6, Vilnius  
LT-05132, Lietuva  
T: +370 5 266 0550  
www.astrazeneca.lt

### Priminimas apie būtinybę pranešti apie nepageidaujamos reakcijas

Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, susijusias su COVID-19 Vaccine AstraZeneca, naudodamiesi nacionaline spontaninių pranešimų sistema: tiesiogiai internetu, prisijungus <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrvSpecialist> ir užpildant formą; užpildant [pranešimo formą, skirtą specialistams](#) ir atsiunčiant ją el.paštu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt); paštu, adresu Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius arba nemokamu faksu (8-800) 201 31.

### Kompanijos kontaktiniai duomenys

Jeigu apie šią vakciną turite klausimų, kreipkitės į UAB AstraZeneca Lietuva Spaudos g. 6-1, Vilnius 05132, Lietuva. Tel. +370 5 2141423, [www.azcovid-19.com](http://www.azcovid-19.com)

Pagarbiai,

Medicinos reikalų vadovė R&I

May 27, 2021

DocuSigned by:  
*Rūta Stankienė* Rūta Stankienė  
F79F43E0A9904C4...